

## ANTIMICÓTICOS SISTÉMICOS

### DE LA PATOLOGÍA AL FÁRMACO

PATOLOGÍA	Tratamiento	Tratamiento alternativo
<b>PTIRIASIS VERSICOLOR</b> 	<b>Ketoconazol gel</b> 1 aplicación al día durante 1-2 semanas	<b>Itraconazol</b> 100 mg/día durante 7-10 días
<b>TIÑA DEL CUERPO</b> 	<b>Terbinafina:</b> <b>Crema</b> 1 aplicación de 1 a 4 semanas Casos amplios: <b>Oral</b> 250mg/día 6 semanas	<b>Clotrimazol, Ketoconazol, Miconazol.</b> (Crema) De 1 a 2 aplicaciones/día durante 2 a 4 semanas  <b>Itraconazol oral</b> 100 mg/día durante 7-10 días
<b>TIÑA EN CUERO CABELLUDO</b> 	<b>Griseofulvina:</b> 20-25 mg/kg/día (niños) en 2 dosis durante 4 a 8 semanas o hasta 2 semanas tras la curación  <b>Terbinafina</b> 250 mg/día durante un mínimo de 6 semanas	<b>Fluconazol</b> 5-6 mg/kg en dosis única diaria durante 3 a 6 semanas  <b>Itraconazol</b> 5 mg/kg de 2 a 8 semanas
<b>CANDIDIASIS OROFARINGEA</b> 	<b>Nistatina</b> en solución	<b>Fluconazol</b> 50-100 mg/día durante 1-2 semana
<b>CANDIDIASIS GENITAL</b> 	<b>Clotrimazol</b> crema 1 vez/día durante 3 a 7 días	<b>Fluconazol</b> 150 mg dosis única
<b>INTERTRIGO CANDIDIÁSICO</b> 	<b>Antisépticos y astringentes tópicos</b> (sulfato de zinc 1/1.000)  <b>Combinación de antimicótico y corticoide tópico</b> (hidrocortisona + miconazol)	En casos extensos: <b>Fluconazol</b> 100 mg/día durante 7-10 días
<b>ONICOMICOSIS</b> 	<b>Terbinafina oral</b> 250 mg/día durante al menos 3 meses	<b>Itraconazol</b> 3-5 mg/kg/día en dosis única diaria (generalmente 200 mg/24 h) durante 12 semanas en los pies y 8 semanas en las manos  El tratamiento oral puede acompañarse de la aplicación de laca ungueal de <b>amorolfina</b> o <b>ciclopirox olamina</b> 2 veces por semana  Tratamiento pulsátil. <b>Itraconazol</b> 200 mg/día durante 7 días, seguidos de 3 semanas sin tratamiento; 3 ciclos (pies) y 2 ciclos (manos)