

## TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL CLAMIDIA

PATOLOGIA	TRATAMIENTO	DOSIS	ALTERNATIVAS
<b>CLAMIDIA. Adolescentes.</b>	<b>Azitromicina</b> o <b>Doxiciclina</b> <sup>1</sup>	1 gr oral en dosis única  100 mg orales dos veces al día/ 7 días	<b>Eritromicina base</b> <sup>2</sup> 500 mg oral 4 veces al día/ 7 días o <b>Eritromicina etilsuccinato</b> <sup>3</sup> 800 mg oral 4 veces al día/ 7 días o <b>Levofloxacin</b> <sup>4</sup> 500mg una vez al día/ 7 días o <b>Ofloxacin</b> <sup>5</sup> 300 mg oral dos veces al día/ 7 días
<b>Embarazo</b> <sup>3</sup>	<b>Azitromicina</b> <sup>5</sup> <a href="http://www.cdc.gov/std/tg2015/clamydia.htm#spec-con">http://www.cdc.gov/std/tg2015/clamydia.htm#spec-con</a>	1 gr oral en dosis única	<b>Amoxicilina</b> 500 mg oral 3 veces al día/ 7 días o <b>Eritromicina base</b> <sup>2,6</sup> 500 mg 4 veces al día/ 7 días o <b>Eritromicina base</b> <sup>2,6</sup> 250 mg 4 veces al día/ 14 días o <b>Eritromicina etilsuccinato</b> 800 mg oral 4 veces al día/ 7 días <b>Eritromicina etilsuccinato</b> 400 mg oral 4 veces al día/ 14 días
<b>Niños (45 kg. Urogenital y rectal.</b>	<b>Eritromicina base</b> <sup>7</sup> o <b>etinilsuccinato</b>	50 mg/kg/día oral (dividido en 4 dosis) diaria/ 14 días.	Los datos están limitados sobre la efectividad o no y la dosis optima de azitromicina para la clamidia.
<b>Neonatos: Oftalmia neonatorum, neumonía.</b>	<b>Eritromicina base</b> <sup>7</sup> o <b>etilsuccinato</b>	50 mg/kg/día oral (dividido en 4 dosis) diaria/ 14 días.	<b>Azitromicina</b> 20 mg/kg/día orales, en 1 dosis diaria/ 3 días

**NOTAS:**

- No se debe administrar en el embarazo, la lactancia, o para los niños < 8 años de edad.
- Si el paciente no puede tolerar altas dosis de horarios eritromicina base, el cambio a 250 mg 4 veces/ día/ 14 días.
- Si el paciente no puede tolerar altas dosis de eritromicina etilsuccinato, cambiar a 400 mg por vía oral 4 veces al día/ 14 días.
- Contraindicado para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
- La experiencia clínica y los estudios publicados sugieren que la azitromicina es segura y eficaz.
- La eritromicina estolato está contraindicado en el embarazo.
- Efectividad del tratamiento de eritromicina es de aproximadamente 80%; Un segundo ciclo de la terapia puede ser necesaria.

Estas son las directrices resumidas de la **actualización de junio de 2015 para las Directrices de la CDC 2010 para el tratamiento de Enfermedades de Transmisión Sexual**. Este resumen debe servir como fuente de orientación clínica y terapéutica. Las opciones terapéuticas se han priorizado en base a la eficacia, costo, o por conveniencia. También se debería de evaluar el tratamiento de las parejas sexuales (<http://www.cdc.gov/std/ept/default.htm>)

Direcciones electrónicas donde se puede encontrar la información (En inglés):

<http://www.cdc.gov/std/default.htm> (Información de las ETS-STD)

<http://www.cdc.gov/std/treatment/> (Información del tratamiento de las ETS-STD)

<http://www.cdc.gov/std/tg2015/2015-pocket-guide.pdf> (Guía Resumida)

<http://www.cdc.gov/std/tg2015/2015-wall-chart.pdf> (Tabla de tratamientos)

<http://www.cdc.gov/std/pregnancy/treatment.htm> (Información del tratamiento en el embarazo)