

## TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL PEDICULOSIS PUBIS

PATOLOGIA	TRATAMIENTO	DOSIS	ALTERNATIVAS
PEDICULOSIS PUBIS	<b>Permetrina</b> 1% crema o	Aplicar en el área afectada y lavar después de 10 minutos	<b>Malathion</b> 0,5% en loción, aplicadas 8-12 horas y lavar  <b>Ivermectina</b> 250 µg/kg oral y repetir a las 2 semanas
	<b>Piretrinas con butóxido de piperonil</b>	Aplicar en el área afectada y lavar después de 10 minutos	

Estas son las directrices resumidas de la **actualización de junio de 2015 para las Directrices de la CDC 2010 para el tratamiento de Enfermedades de Transmisión Sexual**. Este resumen debe servir como fuente de orientación clínica y terapéutica. Las opciones terapéuticas se han priorizado en base a la eficacia, costo, o por conveniencia. También se debería de evaluar el tratamiento de las parejas sexuales (<http://www.cdc.gov/std/ept/default.htm>)

Direcciones electrónicas donde se puede encontrar la información (En inglés):

<http://www.cdc.gov/std/default.htm> (Información de las ETS-STD)

<http://www.cdc.gov/std/treatment/> (Información del tratamiento de las ETS-STD)

<http://www.cdc.gov/std/tg2015/2015-pocket-guide.pdf> (Guía Resumida)

<http://www.cdc.gov/std/tg2015/2015-wall-chart.pdf> (Tabla de tratamientos)

<http://www.cdc.gov/std/pregnancy/treatment.htm> (Información del tratamiento en el embarazo)