

LA ENFERMEDAD DE PARKINSON PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD Y TRATAMIENTO

APARICIÓN TEMPRANA 

APARICIÓN TARDÍA

	SÍNTOMAS TEMPRANOS Temblor, letra pequeña, pérdida de olfato, problema con el sueño, dificultad para caminar o moverse, estreñimiento, voz baja, falta de expresión facial, mareo o desmayo, encorvamiento de la espalda	FLUCTUACIÓN MOTORA	DISCINESIAS	SÍNTOMAS EMERGENTES RESISTENTES A LOS MEDICAMENTOS ^a . Disfunción de la marcha, hablar bajo (hipofonía) y problemas cognitivos y de memoria	INCAPACIDAD EN LOS SÍNTOMAS RESISTENTES A LOS MEDICAMENTOS ^b Disfagia, caídas y problemas cognitivos y de memoria
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO					
TRATAMIENTO DE LOS SÍNTOMAS MOTORES					
INHIBIDORES MAO-B Selegilina, Rasagilina	Monoterapia				
LEVODOPA Asociado a Inhibidores de la DOPA descarboxilasa: Carbidopa, Benserazida					Monoterapia
AGONISTAS DOPAMINÉRGICOS Ropinirol, Pramipexol					
INHIBIDORES COMT Entacapona					
AMANTADINA					
TERAPIA DE LIBERACIÓN DE LA BOMBA Gel intestinal de levodopa Apomorfina subcutánea					c
TRATAMIENTO DE LOS SÍNTOMAS NO MOTORES					
ANTIDEPRESIVOS					
ANTIPSICÓTICOS Clozapina, Quetiapina,					
INHIBIDORES DE LA COLINESTERASA					
TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO					
ESTIMULACIÓN CEREBRAL PROFUNDA					c
EJERCICIO					
TERAPIA FÍSICA Y OCUPACIONAL					
LOGOPEDIA Y TERAPIA DE LA DEGLUCIÓN					
CUIDADO PSICOSOCIAL					

- ✓ Las barras indican aproximadamente los periodos de inicio y duración de cada tratamiento excepto cuando se indique
- ✓ COMT es Catecol-O-metil transferasa
- ✓ Para el tratamiento de los síntomas motores, los medicamentos serán usualmente añadido secuencialmente
- ✓ Los inhibidores de la MAO tipo B (Monoamino oxidasa) en monoterapia pueden ser iniciados en el periodo de síntomas tempranos seguidos de la adición de Levodopa o agonistas dopaminérgicos. Como los síntomas progresan, otros medicamentos pueden añadirse y luego suspenderse en relación con la aparición de síntomas de resistencia a los medicamentos o efectos adversos. La levodopa puede continuarse hasta etapas tardías de la enfermedad como monoterapia.
- ✓ Los síntomas de resistencia a la medicación hacen referencia a los que aparecen en el tratamiento de los síntomas motores y serán:
 - a.- Disfunción de la marcha, hablar bajo (hipofonía) y problemas cognitivos y de memoria
 - b.- Disfagia, caídas y problemas cognitivos y de memoria
 - c.- Mas allá de este punto, la terapia de liberación desde bomba y estimulación profunda cerebral no deberían iniciarse pero pueden continuarse si ya han sido prescritas.

BIBLIOGRAFÍA:

Adaptado de:

Management of Parkinson Disease in 2017. Personalized Approaches for Patient-Specific Needs. Michael S. Okun, MD1. JAMA. 2017;318(9):791-792. doi:10.1001/jama.2017.7914.

<https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2650798>

Enfermedad de Parkinson. 10 signos de alerta temprana de National Parkinson Foundation. <http://www.parkinson.org/espanol/10signos>