

ACTUALIZACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE EXCLUSIÓN EN LAS ESCUELAS DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA DE LA CONSELLERÍA DE SANIDAD DE LA XUNTA DE GALICIA

Incluida en Enero de 2016
Documento en PDF

Como los centros escolares son lugares para a transmisión de ciertas infecciones, y la exclusión temporal de los enfermos es un modo de reducir la transmisión, desde el año 2000 a Dirección General de Salud Pública emite unas ["Recomendaciones de exclusión en escuelas infantiles y colegios"](#), que han sido revisadas, y no presentan cambios con respecto a la revisión del 2012) y que se reproducen en la siguiente tabla.

| ENFERMEDAD | PERIODO DE EXCLUSIÓN RECOMENDADO |
|---|--|
| PATOLOGÍA GASTROINTESTINAL | |
| ENTERITIS POR E. COLI | Consultar con la sección de epidemiología de la Jefatura territorial de Sanidad o con SAEG |
| SALMONELOSIS TYPHY Y PARATYPHI | Consultar con la sección de epidemiología de la Jefatura territorial de Sanidad o con SAEG |
| SHIGELOSIS | Consultar con la sección de epidemiología de la Jefatura territorial de Sanidad o con SAEG |
| GIARDIASIS | Hasta 24 horas después de que rematen los síntomas |
| CRYPTOSPORIDIOSIS (Evitar piscina hasta 2 semanas de que terminen los síntomas) | Hasta 48 horas después de que rematen los síntomas |
| GASTROENTERITIS VIRICA | Hasta 24 horas después de que rematen los síntomas |
| OTRAS GASTROENTERITIS BACTERIANAS | Hasta 24 horas después de que rematen los síntomas |
| PATOLOGÍA RESPIRATORIA | |
| GRIPE | Hasta que rematen los síntomas |
| TOS FERINA | Si está recibiendo tratamiento 5 días; Sino está recibiendo tratamiento: 21 días desde el inicio de los síntomas |
| TUBERCULOSIS | Consultar con la Unidad de Tuberculosis (UTB) de la área de salud |
| DIFTERIA | Consultar con la sección de epidemiología de la Jefatura territorial de Sanidad o con SAEG |
| PATOLOGIA DE LA PIEL Y MUCOSAS | |
| CONJUNTIVITIS | Ninguno, salvo cuando haya más casos en entorno. Entonces consultar con la sección de epidemiología de la Jefatura territorial de Sanidad o con SAEG |
| ERITEMA INFECCIOSO | Ninguno |
| ECARLATINA | Hasta 24 horas después del inicio del tratamiento con el antibiótico correcto |
| ESTOMATITIS VESICULAR CON EXANTEMA | Ninguno |
| EXANTEMA SÚBITO | Ninguno |
| HERPES SIMPLE | Ninguno |
| IMPÉTIGO | Hasta 24 horas después del inicio del tratamiento, de garantizar el vendaje oclusivo de las lesiones de zonas descubiertas |
| ESTAFILOCOCO AUREUS METICILIN-RESISTENTE (Evitar piscina y deportes de contacto hasta que terminen los síntomas) | Ninguno |
| MOLUSCUM CONTAGIOSO (Evitar piscina y deportes de contacto hasta que terminen los síntomas) | Ninguno |
| PIÉ DE ATLETA | Ninguno |
| PEDICULOSIS | Ninguno |

| | |
|---|--|
| RUBEOLA | Consultar con la sección de epidemiología de la Jefatura territorial de Sanidad o con SAEG |
| SARAMPiÓN | Consultar con la sección de epidemiología de la Jefatura territorial de Sanidad o con SAEG |
| SARNA | Hasta el día después de comenzar el tratamiento |
| TIÑA (DERMATOFITOSIS) | Hasta que se inicie el tratamiento con antifúngicos. |
| VARICELA | Hasta 5 días que siguen al inicio del exantema |
| VERRUGAS | Ninguno |
| OTRAS PATOLOGÍAS | |
| FARINGITIS ESTREPTOCOCICA | Hasta 24 horas después del inicio del tratamiento con el antibiótico correcto |
| HEPATITIS A | Consultar con la sección de epidemiología de la Jefatura territorial de Sanidad o con SAEG |
| ENFERMEDAD MENINGOCOCICA | Consultar con la sección de epidemiología de la Jefatura territorial de Sanidad o con SAEG |
| MENINGITIS VÍRICA (excepto la debida al virus de la parotiditis) | Ninguna |
| MONONUCLEOSIS INFECCIOSA | Ninguna |
| PAPERAS | Los 5 días que siguen al comienzo de las paperas |
| OXIUROS | Ninguno |

BIBLIOGRAFÍA:

Health Protection Agency:

http://www.hpa.org.uk/web/HPAwebFile/HPAweb_C/1194947358374

Departamento de Saúde de Australia:

https://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/publications/attachments/ch55e_exclusion_period_poster_130701.pdf