


DEPRESIÓN. ROTACIÓN DE ANTIDEPRESIVOS


Dra. Ana Losada Abalo. Medico Interno Residente. Centro de Salud de Elviña (A Coruña). Área Sanitaria de A Coruña e Cee. Servicio Galego de Saúde. A Coruña

FORMAS DE ROTACIÓN

a) Cambio directo




- El **tratamiento se inició hace menos de 6 semanas**
- Existen efectos adversos graves
- Cambio entre fármacos del mismo grupo terapéutico




- El **cambio se produce entre un IRSR y un IRSN**
- Indicado especialmente en el cambio de paroxetina a **DULOXETINA O VENLAFAXINA**

b) Cross-tapering




- Se trata del **método de elección en la mayoría de los casos.**
- Sensibles a síntomas de retirada
- Partimos de dosis altas
- Partimos de fármacos incluidos en el grupo de "otros" antidepresivos
- Para el **cambio entre IRSR y ATC.**

c) Cambio solapado



- En casos de **respuesta parcial y que queramos preservar el efecto del primer fármaco**
- Aumenta la probabilidad de interacciones y efectos adversos

d) Cambio secuencial



ROTACIÓN SEGÚN GRUPOS DE ANTIDEPRESIVOS

	IMAO	ATC	ISRS	ISRN
IMAO	Cambio secuencial con lavado de 2 semanas	Cambio secuencial con lavado de 2 semanas		
ATC	Cambio secuencial con lavado de 2 semanas	Cross-tapering		
ISRS	Cambio secuencial con lavado de 1 semana (5-6 semanas para fluoxetina)	Cross-tapering Cambio secuencial con lavado de 1 semana (fluoxetina)	Cross-tapering Cambio secuencial con lavado de 1 semana (fluoxetina) Cambio directo a dosis equivalentes	Cross-tapering Cambio secuencial con lavado de 1 semana (fluoxetina) Cambio directo con precaución
ISRN	Cambio secuencial con lavado de 1-2 semanas	Cross-tapering	Cross-tapering Cambio directo con precaución	Cross-tapering Cambio directo a dosis equivalentes.

Nota: Es importante conocer cada una de las indicaciones de los antidepresivos, sus efectos secundarios o colaterales, las advertencias y las precauciones especiales de su empleo, así como, las interacciones con otros medicamentos.

Adaptado de:

Guía de uso seguro, desprescripción y cambio de antidepresivos del Boletín Farmacoterapéutico de Navarra. Bol Inf Farmacoter Navar. 2021;29(4):1-23 https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/B6C5E65F-C8C6-497A-9F74-1A25FC5C2C2C/477512/Bit_v29n4.pdf

Desprescripción de Antidepresivos. Boletín Farmacoterapéutico de Castilla- La Mancha. Vol XXII. Nº 3. 2021. https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/farmacia/bft_2021_3_deprescripcion_de_antidepresivos_1.pdf

Kennedy SH, Lam RW, McIntyre RS, et al. Canadian Network for mood and anxiety treatments (CANMAT) 2016. Clinical Guidelines for the Management of adults with major depressive disorder: Section 3. Pharmacological Treatments. Can J Psychiatry. 2016 Sep; 61(9): 540-560.

NICE-National Institute for Health and care Excellence. NICE Pathways. Antidepressant treatment in adults. September 2019. Disponible en: <http://pathways.nice.org.uk/pathways/depression>

Sesión clínica "Trastornos depresivos" de la Dra. María Ángeles Albarrán Barrado. FEA de Psiquiatría. CHUAC A CORUÑA

Consulta de farmacología en la página Vademecum (url:<https://www.vademecum.es>)