

ANTISÉPTICOS COMPARACIÓN

	POVIDONA IODADA	ALCOHOL	PEROXIDO DE HIDROGENO (Agua oxigenada)	CLORHEXIDINA 1%
ESPECTRO DE ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA	Gram + Estafilococos resistentes a la meticilina (MRSA) Gram – (Pseudomona), Esporas, hongos y virus	Gram + Bacterias Gram – Virus	Gram + Bacterias Gram – Virus (Solo concentraciones al 3%)	Gram + Estafilococos resistentes a la meticilina (MRSA) Gram – (Pseudomona), Esporas, hongos y virus
INDICACIÓN APROBADA	Desinfectante de la piel de uso general, pequeñas heridas y cortes superficiales, quemaduras leves, rozaduras	Antiséptico de la piel	Antiséptico indicado para las heridas superficiales de la piel y enjuague bucal tras extracciones dentales, en adultos y adolescentes mayores de 12 años	Antiséptico de heridas y quemaduras leves de la piel. Antiséptico del ombligo en recién nacidos
INICIO DE ACTIVIDAD (RAPIDEZ)	3 minutos	2 minutos	Inmediato	15-30 segundos
EFFECTO RESIDUAL (DURACIÓN)	3 horas	Bajo	Nulo	6 horas
TOXICIDAD	Puede producir reacciones cutáneas locales. Al aplicar sobre las heridas puede producir efectos sistémicos adversos	No poner en contacto con las mucosas, es muy irritante	En soluciones concentradas produce quemaduras irritantes en la piel y en las mucosas	Su absorción a través de la piel es mínima. Su toxicidad es prácticamente nula
ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES (Interferencias de la presencia de material orgánico en la actividad del antiséptico, Efectos secundarios, Compatibilidad con otros antisépticos)	Debe evitarse un uso continuado en mujeres embarazadas o lactantes y en personas con alteraciones tiroideas. Evitar el contacto con los ojos, oídos y otras mucosas. No aplicar en intolerantes al yodo o a medicamentos iodados	Mantener bien cerrado. Proteger del calor. El uso prolongado puede producir dermatitis de contacto. No aplicar sobre heridas, porque irrita el tejido dañado y porque puede formar un coágulo que protege a las bacterias resistentes. Evitar el contacto con los ojos. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. No aplicar sobre heridas profundas y extensas.	Puede lesionar tejidos en cavidades cerradas. Riesgo de embolia gaseosa. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.	Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. No utilizar en ojos ni oídos, ni en el interior de la boca u otras mucosas.
SEGURIDAD GENERAL	Retrasa el crecimiento de tejido de granulación	Inflamable	Inactivo en presencia de aire y luz	Puede dañar los tejidos a concentraciones superiores al 4%