

## **CLASIFICACIÓN DE LOS CORTICOSTEROIDES TÓPICOS SEGÚN SU POTENCIA**

### **POTENCIA MUY ALTA**

Clobetasol 0,05%  
Fluocinolona acetónido 0,2 %

**DECLOBAN<sup>R</sup>, CLOVATE<sup>R</sup>**  
**SYNALAR FORTE<sup>R</sup>**

### **POTENCIA ALTA**

Betametasona valerato unguento 0,1%  
Betametasona dipropionato 0,05%  
Beclometasona dipropionato 0,025 %  
Beclometasona Salicilato 0,025 %  
Desoximetasona 0,25 %  
Diflucortolona valerato 0,05 %  
Fluclorolona acetónido 0,025 %  
Fluocinolona acetónido 0,025 %  
Fluocortolona 0,2 %  
Flupamesona  
Metilprednisolona aceponato 0,1 %  
Mometasona furoato 0,1% unguento  
Prednicarbato 0,25 % unguento

**BETNOVATE<sup>R</sup>, CELESTODERM<sup>R</sup> (ungüento)**  
**DIPRODERM<sup>R</sup>**  
**MENADERM<sup>R</sup>**  
**DEREME<sup>R</sup>**  
**FLUBASON<sup>R</sup>**  
**CLARAL<sup>R</sup>**  
**CUTANIT ULTRA<sup>R</sup>**  
**SYNALAR<sup>R</sup>, GELIDINA<sup>R</sup>**  
**ULTRALAN M<sup>R</sup>**  
**FLUTENAL<sup>R</sup>**  
**ADVENTAN<sup>R</sup>, LEXXEMA<sup>R</sup>**  
**ELOCON UNGÜENTO<sup>R</sup>**  
**BATMEN<sup>R</sup>, PEITEL<sup>R</sup> (ungüento)**

### **POTENCIA MEDIA**

Betametasona valerato 0,1 crema  
Clobetasona butirato 0,05 %  
Hidrocortisona butirato propionato 0,1 %  
Hidrocortisona aceponato 0,1%  
Mometasona furoato 0,1 %  
Prednicarbato 0,25 % crema

**BETNOVATE<sup>R</sup>, CELESTODERM<sup>R</sup>**  
**EMOVATE<sup>R</sup>**  
**ISDINIUM<sup>R</sup>, CENEO<sup>R</sup>**  
**SUNIDERMA<sup>R</sup>**  
**ELOCOM CREMA<sup>R</sup>**  
**BATMEN CREMA<sup>R</sup>, PEITEL CREMA<sup>R</sup>**

### **POTENCIA BAJA**

Hidrocortisona 1 %, 2,5 %  
Fluocortina 0,75 %

**LACTISONA<sup>R</sup>, SCHERICUR<sup>R</sup>**  
**VASPIT<sup>R</sup>**

*Adaptado de Miller JJ, Roling D, Margolis D, Guzzo C. Failure to demonstrate therapeutic tachyphylaxis to topically applied steroids in patients with psoriasis. J Am Acad Dermatol. 1999; 41:546-9.*