

HEPATITIS B. LA VACUNACIÓN ANTI-VHB

Actualización Abril 2011

INDICACIONES

Contactos íntimos o convivientes con portadores de HbsAg
Trabajadores y contactos de instituciones cerradas (disminuidos mentales, instituciones penitenciarias)
Homosexuales masculinos, bisexuales y heterosexuales con múltiples contactos sexuales
Personas con enfermedades de transmisión sexual y sus parejas
Personas que viajan a países endémicos durante 6 meses, o menos si preveen tener relaciones sexuales
Receptores de transfusiones y hemoderivados.
Insuficiencia renal en fases iniciales y hemodiálisis
Personal sanitario y de los servicios públicos con riesgo a exposición a sangre
Personas que practican punciones percutáneas
Grupos étnicos de elevada prevalencia y emigrantes de zonas de alta endemia.
Usuarios de drogas por vía parenteral
Recién nacidos de madre HbsAg positivas
Personas en programas de transplantes
Personas con hepatopatías crónicas e infectadas por en virus de la hepatitis C y el VIH.

PAUTAS Y DOSIS DE VACUNAS ANTIHEPATITIS B.

Engerix B		HB Vaxpro	
Lactantes	10 ug 0,2,6 meses 2,4,6 meses	Lactantes y Adolescentes	5 ug 0,2,6 meses 2,4,6 meses
Adolescente	10 ug 0,1,6 meses		
Adultos	20 ug 0,1,6 meses	Adultos y mayores de 15 años	10 ug 0,1,6 meses
Adultos en hemodiálisis	40 ug 0,1,2,6 meses	Adultos en hemodiálisis	40 ug 0,1,6 meses