

HEPATITIS B. PROFILAXIS POSTEXPOSICIÓN EXTRALABORAL PERMUCOSA O PERCUTÁNEA AL VHB

Actualización Abril 2011

PROFILAXIS POSTEXPOSICIÓN EXTRALABORAL PERMUCOSA O PERCUTÁNEA AL VHB

Estado vacunal de la persona expuesta	Fuente HbsAg +	Fuente desconocida*
No vacunados	IGHB antes de las 24 horas e iniciar vacunación	Iniciar vacunación
Personas en proceso de vacunación o con pauta incompleta	Administrar IGHB y completar pauta de vacunación	Completar vacunación
Vacunados con certificado de vacunación y respuesta desconocida	Administrar dosis de recuerdo	No precisa actuación

Dosis de IGHB (inmunoglobulina específica de hepatitis B): = 0,06 ml/kg intramuscular, preferentemente antes de las 24 horas. Período máximo: antes de 7 días en exposiciones percutáneas y 14 días en contactos sexuales.

Vacuna de la hepatitis B: Se debe de administrar lo antes posible y antes de 8 días.

* La CDC, en caso de que la fuente sea desconocida o no esté disponible recomiendan administrar solamente la vacuna.

PROFILAXIS POSTEXPOSICIÓN OCUPACIONAL PERMUCOSA O PERCUTÁNEA AL VHB

Estado vacunal de la persona expuesta	Fuente HbsAg +	Fuente HbsAg -	Fuente desconocida
No vacunado previamente	1ª dosis de IGHB* e iniciar vacunación	Iniciar vacunación	Iniciar vacunación
Vacunado previamente respondedor**	No precisa actuación	No precisa actuación	No precisa actuación
Vacunado previamente no respondedor	1ª dosis de IGHB* e reiniciar vacunación ó 2 dosis de IGHB*	No precisa actuación	1ª dosis de IGHB* e reiniciar vacunación ó 2 dosis de IGHB*
Vacunado previamente respuesta desconocida	Determinar el título de anti-Hbs: Niveles adecuados: No precisa actuación Niveles inadecuados: Iniciar vacunación	No precisa actuación	Determinar el título de anti-Hbs: Niveles adecuados: No precisa actuación Niveles inadecuados: Iniciar vacunación

* Dosis de IGHB: = 0,06 ml/kg intramuscular. Se debe de administrar preferentemente dentro de las 24 horas postexposición. No está demostrado su efecto después de 7 días postexposición.