

INDICACIÓN DE PAXLOVID®¹:

PAXLOVID® está indicado para el **tratamiento** de la **COVID-19** en **adultos** que no requieren aporte de oxígeno suplementario y que tienen un **riesgo alto de progresar a COVID-19 grave**.

FACTORES DE RIESGO¹:



Tener 60 años o más, con independencia de las enfermedades concomitantes



Diabetes



Sobrepeso (IMC > 25)



Enfermedad pulmonar crónica (incluido el asma)



Enfermedad renal crónica



Ser fumador activo



Enfermedad o tratamiento causante de inmunodepresión



Hipertensión



Enfermedad cardiovascular



Anemia drepanocítica



Trastornos del desarrollo neurológico



Cáncer activo



Dependencia tecnológica relacionada con la atención médica

POSOLOGÍA¹:

PAXLOVID® se administra por vía oral, desde casa, dos veces al día durante 5 días¹

El tratamiento debe iniciarse lo antes posible tras una prueba positiva y ≤ 5 días después del comienzo de los síntomas.

Durante 5 días consecutivos¹

Los pacientes deben tomar los 3 comprimidos juntos



DOSIS MATUTINA

- Dos comprimidos de color rosa de 150 mg de Nirmatrelvir
- Un comprimido de color blanco de 100 mg de ritonavir



DOSIS NOCTURNA

- Dos comprimidos de color rosa de 150 mg de Nirmatrelvir
- Un comprimido de color blanco de 100 mg de ritonavir



Ajustes de la dosis en caso de insuficiencia renal

- En caso de insuficiencia renal moderada (eGRF ≥ 30 a <60 ml/min) la dosis de PAXLOVID® debe reducirse a 1 comprimido de Nirmatrelvir y 1 comprimido de ritonavir, dos veces al día durante 5 días.

Durante 5 días consecutivos¹

Los pacientes deben tomar los 2 comprimidos juntos



DOSIS MATUTINA

- Un comprimidos de color rosa de 150 mg de Nirmatrelvir
- Un comprimido de color blanco de 100 mg de ritonavir



DOSIS NOCTURNA

- Un comprimidos de color rosa de 150 mg de Nirmatrelvir
- Un comprimido de color blanco de 100 mg de ritonavir



- No es necesario ajustar la dosis de PAXLOVID® en los pacientes con insuficiencia renal leve (eGFR ≥ 60 a 90ml/min).¹
- PAXLOVID® no debe ser utilizado en pacientes con insuficiencia renal grave (eGFR <30 ml/min).

Ajustes de la dosis en caso de insuficiencia hepática¹

- No es necesario ajustar la dosis de PAXLOVID® en pacientes con insuficiencia hepática leve (clase A de Child-pugh) o moderada (clase B de Child-pugh).
- PAXLOVID® no debe ser utilizado en pacientes con insuficiencia hepática grave.